

به نام او

فصل اول


کیهان زادگاه الفبای هستی

تلاش برای شناخت کیهان همچنان ادامه دارد. نمونه‌ای از آن، سفر طولانی و تاریخی دو فضاپیما به نام وویجر ۱ و ۲ در سال ۱۹۷۷ برای شناخت بیشتر سامانه‌ی خورشیدی است. این دو فضاپیما ماموریت داشتند با گذر از کنار سیاره‌های مشتری، زحل، اورانوس و نپتون، شناسنامه فیزیکی و شیمیایی آنها را تهیه کنند.

نکته: عناصر مهم موجود در زمین به ترتیب آهن (Fe)، اکسیژن (O)، سیلیسیم (Si)، منیزیم (Mg)، نیکل (Ni)، گوگرد (S)، کلسیم (Ca)، آلومینیم (Al) است. همچنین عناصر مهم موجود در مشتری به ترتیب هیدروژن (H)، هلیوم (He)، کربن (C)، اکسیژن (O)، نیتروژن (N)، گوگرد (S)، آرگون (Ar) و نئون (Ne) است.

برخی بر این باور هستند که پیدایش هستی با انفجاری مهیب (مهبانگ) بوده و با انرژی عظیمی که آزاد شده، ذره‌های زیر اتمی الکترون، پروتون و نوترون ایجاد شده‌اند. با وجود این ذره‌ها، عناصر هیدروژن و هلیوم بوجود آمدند. با گذشت زمان و کاهش دما، گازهای هیدروژن و هلیوم تولید شده، متراکم می‌شوند و مجموعه‌های گازی به نام **سحابی** ایجاد می‌کنند. بعدها این سحابی سبب پیدایش ستاره‌ها و کهکشان شدند. سحابی عقاب یکی از مکان‌های زایش ستاره‌هاست.

درون ستاره‌ها همانند خورشید در دماهای بسیار بالا، واکنش‌های هسته‌ای رخ می‌دهد، واکنش‌هایی که در آنها از عنصرهای سبک‌تر، عنصرهای سنگین‌تر پدید می‌آیند. ستاره‌ها متولد می‌شوند، رشد می‌کنند و زمانی می‌میرند. مرگ ستاره با یک انفجار بزرگ همراه است که سبب می‌شود عنصرهای تشکیل شده در آن در فضا پراکنده شود. هرچه دمای ستاره بیشتر باشد، شرایط تشکیل عنصرهای سنگین‌تر فراهم می‌شود. بعد از انفجار این ستاره‌ها اتم‌های سنگین درون آنها در سرتاسر گیتی پراکنده می‌شود.



عدد جرمی و ایزوتوپ (هم مکان)

جرم اتم به تعداد پروتون و نوترون‌های درون هسته بستگی دارد و جرم الکترون تاثیری ندارد. به مجموع تعداد پروتون و نوترون‌های یک اتم عدد جرمی می‌گویند و با نماد **A** آن را نشان می‌دهند.

$$A = Z + N, \quad \frac{A}{Z}E$$

جرم عناصر با طیف سنج جرمی به صورت دقیق اندازه‌گیری می‌شود. این اندازه‌گیری‌ها نشان می‌دهد که همه اتم‌های یک عنصر جرم یکسانی ندارند. از آنجا که عدد اتمی و در واقع تعداد پروتون‌ها در همه اتم‌های یک عنصر یکسان است در نتیجه این تفاوت مربوط به نوترون‌های موجود در هسته اتم است. این بررسی‌ها منجر به معرفی مفهوم ایزوتوپ شد. ایزوتوپ‌ها در برخی خواص فیزیکی وابسته به جرم، مانند چگالی با یکدیگر تفاوت دارند.

ایزوتوپ‌ها اتم‌های یک عنصر هستند که عدد اتمی یکسان و عدد جرمی متفاوت دارند. برای مثال آزمایش روی نمونه‌های طبیعی از گاز کلر وجود دو ایزوتوپ کلر $^{37}_{17}Cl$ و $^{35}_{17}Cl$ را نشان داد.

نکته: منیزیم دارای ۳ ایزوتوپ $^{24}_{12}Mg$ ، $^{25}_{12}Mg$ ، $^{26}_{12}Mg$ است. که درصد فراوانی $^{24}_{12}Mg$ از همه بیشتر و بعد از آن $^{26}_{12}Mg$ است.

نکته: یک نمونه طبیعی از هیدروژن دارای ۳ ایزوتوپ به نام‌های پروتیم (1_1H)، دوتریم (هیدروژن سنگین) (2_1D) و تریتیم (هیدروژن پرتوزا) (3_1T) است. دو ایزوتوپ اول پایدار هستند و بیش از 99.9 درصد از هر نمونه هیدروژن را پروتیم تشکیل می‌دهد. اما تریتیم دارای نیم عمر حدود ۱۲ سال است و پرتوزا می‌باشد.

همچنین می‌توان در آزمایشگاه ایزوتوپ‌های ناپایدارتر تا 7_1H نیز تولید کرد که نیم عمرهای بسیار ناچیز دارند.

تست: نسبت شمار نوترون‌ها به شمار پروتون در سنگین‌ترین ایزوتوپ طبیعی عنصر هیدروژن، کدام است؟ (تجربی ۹۸)

ذهن زیبا

۱(۱) ۲(۲) ۳(۳) ۴(۴)

نیمه عمر: به مدت زمانی که طول می‌کشد تا نیمی از اتم‌های یک نمونه عنصر ناپایدار دچار فروپاشی شده و متلاشی شوند نیمه عمر می‌گویند.

روابط محاسباتی نیمه عمر

جرم باقیمانده: $m/2^n$

جرم متلاشی شده: $m - m/2^n = m(1 - 1/2^n)$

مثال: یک عنصر پرتوزا با نیمه عمر ۲۰ دقیقه بعد از ۲ ساعت، ۶۳ گرم از جرم آن متلاشی می‌شود. جرم اولیه این عنصر را بدست آورید.

$$m - m/64 = 63 \rightarrow m = 64$$

مثال: یک عنصر پرتوزا با نیمه عمر ۲۰ دقیقه بعد از چند ساعت، ۸۷.۵ درصد از جرم آن متلاشی می‌شود؟

$$100 / 2^n = 12.5 \rightarrow n = 3 \rightarrow 1h$$

مثال: اگر نیمه عمر عنصر فرضی X، ۲ ساعت باشد و پس از گذشت ۱۶ ساعت جرم هسته‌های باقی‌مانده از عنصر X برابر با جرم هسته‌های تجزیه شده عنصر Y باشد، نیمه عمر عنصر فرضی Y چند ساعت است؟ (جرم اولیه عنصر X، ۱۹۲ برابر جرم اولیه عنصر Y است).

$$192m / 2^8 = m(1-1/2^n) \rightarrow 0.75 = 1-1/2^n \rightarrow n = 2 \rightarrow n = 8h$$

نکته: اغلب هسته‌هایی که نسبت شمار نوترون‌ها به پروتون‌های آنها برابر یا بیش از ۱.۵ باشد ناپایدارند و با گذشت زمان متلاشی می‌شوند. ایزوتوپ‌های پرتوزا و ناپایدار را پرتوزا می‌نامند.

جرم یک اتم

شیمی‌دان‌ها در سده‌های ۱۸ و ۱۹ میلادی موفق شدند به روش تجربی جرم اتم‌های بسیاری از عنصرهای شناخته شده تا آن زمان را به طور نسبی اندازه‌گیری کنند. این آزمایشات نشان داد که برای مثال جرم یک اتم اکسیژن ۱.۳۳ برابر جرم یک اتم کربن و جرم یک اتم کلسیم ۲.۵ برابر جرم یک اتم اکسیژن است. استفاده از این نسبت‌ها در محاسبه‌های آزمایشگاهی کاری بسیار سخت است. در نتیجه تصمیم گرفتند یک عنصر را به عنوان مبنا در نظر بگیرند و سپس جرم عنصرهای دیگر را محاسبه کنند. بعد از اینکه هیدروژن و اکسیژن را در نظر گرفتند، سرانجام پایدارترین و فراوان‌ترین ایزوتوپ کربن یعنی کربن - ۱۲ ($^{12}_6C$) برای این منظور انتخاب گردید. آنها جرم کربن - ۱۲ را **دقیقا** معادل ۱۲ در نظر گرفتند.

در نتیجه اتم اکسیژن که جرم ۱.۳۳ برابر جرم کربن داشت، در این مقیاس دارای جرم ۱۶ شد. به این ترتیب جرم باقی اتم‌ها نیز در نظر گرفته شد. واحد این جرم اتمی را amu (atomic mass unit) گویند. یک amu برابر یک دوازدهم ($\frac{1}{12}$) جرم اتم کربن - ۱۲ است.

هیدروژن (1_1H) در این مقیاس جرم amu 1.008 را دارد.

در این مقیاس جرم نوترون (1_0n) و پروتون (1_1p) تقریباً برابر ۱amu است (نوترون کمی سنگین‌تر از پروتون است) و جرم الکترون (${}^0_{-1}e$) تقریباً $(\frac{1}{1836})$ این مقدار است.

نکته: الکترون، پروتون و نوترون را ذره‌های زیر اتمی یا بنیادی می‌نامند.

تست: با توجه به روند تشکیل عنصرها در ستارگان، از به هم پیوستن حداقل چند اتم از فراوان‌ترین ایزوتوپ هلیم، یک اتم ایزوتوپ ${}^{24}_{12}Mg$ می‌تواند به وجود آید؟ (از تبادل انرژی و تغییرات اندک جرم صرف نظر شود). (ریاضی ۹۸ خارج)

۱۲(۴) ۸(۳) ۶(۲) ۴(۱)

جرم اتمی میانگین

با توجه به وجود ایزوتوپ‌ها و تفاوت در فراوانی آنها برای گزارش جرم نمونه‌های طبیعی از اتم‌های عنصرهای مختلف جرم اتمی میانگین بکار می‌رود. برای محاسبه جرم اتمی میانگین برای یک عنصر داریم:

$$\bar{M} = \frac{M_1 * a_1 + M_2 * a_2 + \dots}{a_1 + a_2 + \dots}$$

M_i : جرم اتمی ایزوتوپ a_i درصد فراوانی ایزوتوپ a_i

مثال: شکل زیر شمار تقریبی اتم‌های لیتیم در یک نمونه طبیعی را نشان می‌دهد. با توجه به آن درصد فراوانی و جرم متوسط لیتیم را محاسبه کنید.



نکته: ایزوتوپ سنگین‌تر لیتیم پایدارتر است.

مثال: جرم اتمی بور ۱۰.۸۱ است. این عنصر دو ایزوتوپ دارد که جرم دقیق آنها ۱۰.۰۱ و ۱۱.۰۱ است. درصد فراوانی ایزوتوپ سنگین‌تر چند است؟

$$10.01 + x * 1/100 = 11.81 \rightarrow x = 80$$

مثال: جرم اتمی میانگین عنصری فرضی دارای سه ایزوتوپ با جرم‌های اتمی 16.1 و 17.1 و 18.1 و درصدهای فراوانی ۲۲ و ۳۲ و ۴۶ را محاسبه کنید.

$$16.1 + (1 \cdot 32 + 2 \cdot 46) / 100 = 16.1 + 124 / 100 = 17.34$$

تست: اگر جرم الکترون با تقریب برابر $\frac{1}{1840}$ جرم هر یک از ذره‌های پروتون و نوترون فرض شود، نسبت جرم الکترون‌ها در اتم ${}^Z_Z A$ به جرم این اتم به کدام کسر نزدیک‌تر است؟ (تجربی ۸۹)

$$\frac{1}{5000} \text{ (۴)}$$

$$\frac{1}{2000} \text{ (۲)}$$

$$\frac{1}{1000} \text{ (۱)}$$

تست: اگر جرم پروتون ۱۸۴۰ برابر جرم الکترون، جرم نوترون ۱۸۵۰ برابر جرم الکترون و جرم الکترون برابر 0.00054 amu در نظر گرفته شود، جرم تقریبی یک اتم تریتمیم برابر چند گرم خواهد بود؟ ($1 \text{ amu} = 1.66 \cdot 10^{-24} \text{ g}$) (ریاضی ۹۳)

$$9.815 \cdot 10^{-22} \text{ (۴)}$$

$$4.24 \cdot 10^{-22} \text{ (۳)}$$

$$9.112 \cdot 10^{-24} \text{ (۲)}$$

$$4.96 \cdot 10^{-24} \text{ (۱)}$$

$$1.66 \cdot 3 \cdot 10^{-24}$$

ذهن زیبا

تست: چند الکترون در اثر مالش باید از سطح یک کره پلاستیکی جدا شود تا تغییر وزن آن با یک ترازوی با حساسیت 0.1 میلی‌گرم قابل اندازه‌گیری باشد و این تعداد الکترون به تقریب چند کولن بار الکتریکی دارد؟ (جرم الکترون حدود $9 \cdot 10^{-28} \text{ g}$ و بار الکتریکی آن $1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ است.) (ریاضی ۹۵)

$$1.66 \cdot 10^4, 1.11 \cdot 10^{23} \text{ (۲)}$$

$$1.78 \cdot 10^3, 3.011 \cdot 10^{23} \text{ (۱)}$$

$$1.78 \cdot 10^4, 1.11 \cdot 10^{23} \text{ (۴)}$$

$$1.648 \cdot 10^3, 3.011 \cdot 10^{23} \text{ (۳)}$$

$$9 \cdot 10^{-28} \cdot x = 0.0001 \rightarrow x = 10^{24} / 9$$

$$10^{24} / 9 \cdot 1.6 \cdot 10^{-19} = 10^5 \cdot 1.6 / 9 = 10^4 \cdot 16 / 9$$

تست: کلر در طبیعت دارای دو ایزوتوپ با جرم اتمی 35amu و 37amu و کربن دارای دو ایزوتوپ با جرم اتمی 12amu و 13amu است. تفاوت جرم مولکولی سبک‌ترین و سنگین‌ترین مولکول کربن تتراکلرید (CCl_4)، چند amu است؟ (ریاضی ۹۴)

۹(۴)

۸(۳)

۷(۲)

۶(۱)

تست: یک مول گاز کلر شامل ۲۰ درصد جرمی ^{35}Cl و ۸۰ درصد جرمی ^{37}Cl است. چگالی این گاز در شرایطی که حجم مولی گازها برابر 30L باشد، چند g.L^{-1} است؟ (عدد جرمی را به تقریب، برابر اتم گرم هر ایزوتوپ در نظر بگیرید.) (تجربی ۹۵)

۱.۴۸(۴)

۱.۳۵(۳)

۱.۲۲(۲)

۱.۱۸(۱)

تست: عنصر A دارای سه ایزوتوپ ^{84}A ، ^{86}A ، ^{88}A است. اگر درصد فراوانی سبک‌ترین ایزوتوپ آن ۲۰٪ و جرم اتمی میانگین A برابر ۸۶.۴ باشد، درصد فراوانی دو ایزوتوپ دیگر به ترتیب از راست به چپ کدام‌اند؟ (عدد جرمی را به تقریب معادل جرم یک مول از هر ایزوتوپ در نظر بگیرید.) (تجربی ۹۵ خارج)

۲۰، ۶۰(۴)

۳۰، ۵۰(۳)

۴۰، ۴۰(۲)

۶۰، ۲۰(۱)

ذهن زیبا

تست: با توجه به داده‌های جدول زیر، جرم مولکولی ترکیب A_2X_3 چند amu است؟ (عدد جرمی را برابر جرم اتمی با یکای amu در نظر بگیرید.) (ریاضی ۹۵ خارج)

^{27}X	^{35}X	^{47}A	^{45}A	ایزوتوپ
۸۰	۲۰	۹۰	۱۰	درصد فراوانی

۲۰۳.۴(۲)

۲۱۳.۶(۱)

۱۸۸.۷(۴)

۱۹۸.۵(۳)

تست- کدام عبارت درست است؟ (ریاضی ۹۶)

(۱) بیشتر ایزوتوپ‌های شناخته شده هیدروژن ناپایدارند.

(۲) در یون ${}^7_3\text{Li}^{2+}$ شمار الکترون‌ها برابر شمار نوترون‌ها است.

(۳) بیشتر اتم‌های کلر را ایزوتوپ‌های سنگین‌تر آن تشکیل می‌دهند.

(۴) اگر جرم اتم عنصری ۲۰۳۳ برابر جرم اتم ${}^{12}_6\text{C}$ باشد، جرم اتمی آن ۱۶amu است.

تست: در واکنش مخلوطی از ایزوتوپ‌های ${}^{16}\text{O}$ و ${}^{18}\text{O}$ با ایزوتوپ‌های ${}^{25}\text{Mg}$ و ${}^{24}\text{Mg}$ امکان تشکیل چند اکسید با جرم‌های مولی متفاوت وجود دارد و نسبت جرم مولی سنگین‌ترین این اکسیدها به جرم مولی سبک‌ترین آنها کدام است؟ (هر دو عنصر با بالاترین ظرفیت خود در نظر بگیرید. عدد جرمی را هم ارز جرم اتمی با یکای $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ فرض کنید.) (ریاضی ۹۶)

$$۱۰۰۲۵ - ۶(۴)$$

$$۱۰۰۷۵ - ۴(۳)$$

$$۱۰۰۲۵ - ۴(۲)$$

$$۱۰۰۷۵ - ۶(۱)$$

تست: عنصر فرضی X دارای دو ایزوتوپ سبک و سنگین با جرم‌های ۱۴amu و ۱۶amu و جرم اتمی میانگین ۱۴.۲amu است. نسبت شمار اتم‌های ایزوتوپ سنگین به سبک، در آن کدام است؟ (ریاضی ۹۸)

$$\frac{1}{11}(۴)$$


$$\frac{1}{10}(۳)$$

$$\frac{1}{9}(۲)$$

$$\frac{1}{8}(۱)$$

ذهن زیبا

تست: عنصر فرضی X دارای دو ایزوتوپ با جرم اتمی ۲۴amu و ۲۷amu است که در شکل زیر باید به ترتیب با دایره‌های سفید و سیاه رنگ نشان داده شوند. اگر جرم اتمی میانگین این عنصر برابر ۲۶.۷amu باشد، چند دایره در شکل زیر باید سیاه رنگ باشد، تا فراوانی ایزوتوپ‌ها را به درستی نشان دهد؟ (ریاضی ۹۸ خارج)



$$۱۶(۱)$$

$$۱۹(۲)$$

$$۲۲(۳)$$

$$۲۷(۴)$$

تست: عنصر A دارای چهار ایزوتوپ با عدد جرمی ۴۹، ۵۱، ۵۳ و ۵۴ است. اگر مجموع فراوانی دو ایزوتوپ اول ۶۵ و فراوانی ایزوتوپ سوم ۱۵ درصد باشد، درصد فراوانی دو ایزوتوپ اول، به ترتیب از راست به چپ کدامند؟ (عدد جرمی ایزوتوپها، برابر جرم اتمی آنها و جرم اتمی میانگین برای عنصر A، برابر 50.95 amu فرض شود.) (تجربی ۹۹)

(۱) 29.5, 35.5 (۲) 17.5, 47.5 (۳) 15, 50 (۴) 14.5, 50.5

تست: منیزیم طبیعی دارای ۳ ایزوتوپ ^{24}Mg با جرم اتمی 23.99 amu و فراوانی ۷۹ درصد ^{25}Mg با جرم اتمی 24.99 amu و فراوانی ۱۰ درصد ^{26}Mg با جرم اتمی 25.98 amu و فراوانی ۱۱ درصد و فلئور تنها به صورت ^{19}F با جرم اتمی 18.99 amu وجود دارد. جرم مولی منیزیم فلئورید (MgF_2) طبیعی برابر چند گرم است؟ (تجربی ۹۹ خارج)

(۱) 61.86 (۲) 62.28 (۳) 64.12 (۴) 66.45

تکنسیم، نخستین عنصر ساخت بشر

از ۱۱۸ عنصر شناخته شده، تنها ۹۲ عنصر در طبیعت یافت می‌شود و باقی ساختگی است. تکنسیم (^{99}Tc) نخستین عنصری بود که در واکنشگاه (راکتور) هسته‌ای ساخته شد. این رادیوایزوتوپ در تصویربرداری پزشکی از جمله استفاده از تصویربرداری غده پروانه‌ای شکل تیروئید کاربرد ویژه‌ای دارد. یون یدید با یونی که حاوی ^{99}Tc است، اندازه مشابهی دارد و غده تیروئید هنگام جذب یدید، این یون را نیز جذب می‌کند. با افزایش مقدار این یون در غده تیروئید، امکان تصویربرداری فراهم می‌شود.

ذهن زیبا

نکته: از آنجا که زمان ماندگاری ^{99}Tc کم است و نمی‌توان مقادیر زیادی از این عنصر را تهیه و برای مدت طولانی نگهداری کرد، بسته به نیاز، آن را با یک مولد هسته‌ای تولید و سپس مصرف می‌کنند.

اورانیم شناخته شده‌ترین فلز پرتوزایی است که یکی از ایزوتوپ‌های آن اغلب به عنوان سوخت در راکتورهای اتمی به کار می‌رود. این ایزوتوپ ^{235}U بوده که فراوانی آن در مخلوط طبیعی از 0.7 درصد کمتر است. فرایندی که در آن مقدار این ایزوتوپ را در مخلوط ایزوتوپ‌های آن افزایش می‌دهند، غنی‌سازی ایزوتوپی نامیده می‌شود.

نکته: کیمیاگری (تبدیل عناصر دیگر به طلا) آرزوی دیرینه بشر بوده است. با پیشرفت علم شیمی و فیزیک، انسان می‌تواند طلا تولید کند. اما هزینه تولید آن به اندازه‌های زیاد است که صرفه اقتصادی ندارد.

نکته: اتم ^{59}Fe یک ایزوتوپ است که برای تصویربرداری از دستگاه گردش خون استفاده می‌شود، زیرا یون‌های آن در ساختار هموگلوبین وجود دارند.

نکته: به گلوکز حاوی اتم پرتوزا، **گلوکز نشان دار** می‌گویند. این ماده (راديو ايزوتوپ) برای **تشخيص توده های سرطانی** کاربرد دارد. توده‌های سرطانی **یاخته‌هایی هستند که رشد غیرعادی و سریع** دارند. با تزریق این ماده به بدن، **گلوکزها بیشتر در نزدیکی توده‌ها تجمع می‌کنند**، زیرا این توده‌ها برای رشد و نمو نیاز به انرژی بیشتری دارند. در نتیجه با استفاده از **آشکار ساز پرتو** می‌توان محل تجمع این راديو ايزوتوپ داخل بدن را مشاهده کرد.

نکته: دود سیگار و قلیان، مقدار قابل توجهی مواد پرتوزا دارد. از این رو **اغلب افرادی که به سرطان ریه دچار می‌شوند، سیگاری هستند.**

تست: چند مورد از مطالب زیر، درباره ${}^{99}Tc$ درست اند؟ (تجربی ۹۸ خارج)

- در تصویربرداری از غده تیروئید، کاربرد دارد.
- نخستین عنصری است که در واکنشگاه هسته‌ای ساخته شد.
- اندازه یون آن درست به اندازه یون یدید است و در تیروئید جذب می‌شود.
- زمان ماندگاری آن اندک است و نمی‌توان مقدار زیادی از آن را تولید و انبار کرد.

۴(۴)

۳(۳)

۲(۲)

۱(۱)

جدول تناوبی عناصر

در جدول دوره‌ای (تناوبی) امروزی، عناصرها براساس افزایش عدد اتمی سازماندهی شده‌اند، به طوری که جدول دوره‌ای عناصرها از عنصر هیدروژن با عدد اتمی یک ($Z = 1$) آغاز و به عنصر شماره ۱۱۸ ختم می‌شود. این جدول، ۷ دوره و ۱۸ گروه دارد. **با پیمایش هر دوره از چپ به راست، خواص عناصرها به طور مشابه تکرار می‌شود**، از این رو چنین جدولی را جدول دوره‌ای (تناوبی) عناصرها نامیده‌اند.

نکته: موقعیت یا مکان هر عنصر در جدول دوره‌ای، شماره گروه و دوره آن را نشان می‌دهد.

نکته: بزرگترین پیشرفت در زمینه دسته‌بندی عناصرها با کارهای مندلیف بدست آمد. با پیمایش هر دوره از چپ به راست خواص عناصرها به طور مشابه تکرار می‌شود، از این رو به جدول دوره‌ای (تناوبی) عناصرها می‌گویند.

محاسبه شماره دوره و گروه با استفاده از گازهای نجیب

شمارش ذره‌ها از روی جرم آنها

ترازوهایی که برای اندازه‌گیری جرم مواد گوناگون به کار می‌رود، دقت اندازه‌گیری متفاوتی دارد. برای مثال، دقت باسکول‌های تنی تا یک دهم تن و دقت ترازوی زرگری تا یک صدم گرم است.

جرم دقیق عناصر با استفاده از دستگاهی به نام **طیف سنج جرمی** اندازه‌گیری می‌شود. با استفاده از این دستگاه جرم یک اتم هیدروژن برابر با $(1\text{amu} = 1.66 \times 10^{-24}\text{g})$ می‌شود. اگر محاسبه کنیم خواهیم دید که در یک نمونه یک گرمی از هیدروژن چه تعداد اتم هیدروژن وجود دارد.

$$N_A = \frac{1}{1.66 \times 10^{-24}} \approx 6.02 \times 10^{23}$$

به این عدد، **عدد آووگادرو** می‌گویند. به هر 6.02×10^{23} عدد از هر ذره‌ای (اتم، مولکول، یون و ...) **یک مول** از آن ذره می‌گویند.

نکته: گرم رایج‌ترین یکای اندازه‌گیری جرم در آزمایشگاه است. اما یکای جرم اتمی، یکای بسیار کوچکی برای جرم به شمار می‌آید و کار با آن در آزمایشگاه در عمل ناممکن است. به همین دلیل به سراغ یکای جرم مولی می‌رویم.

جرم مولی، برابر جرم یک مول از آن ذره است که واحد آن $\frac{\text{g}}{\text{mol}}$ می‌باشد. از ویژگی‌های مهم عدد آووگادرو این است که به صورتی محاسبه شده است که عملاً جرم اتمی برای هر اتم تقریباً برابر با جرم مولی آن گردد.

ذهن زیبا

شیوه ضریب تبدیل

برای حل مسائل به این شیوه یک تساوی بین **کمیت معلوم و مجهول برقرار می‌کنیم سپس با استفاده از ضریب تبدیل یا ضریب تبدیل‌های مناسب کمیت معلوم را به کمیت مجهول تبدیل می‌کنیم.**


(۱) کمیت معلوم \equiv کمیت مجهول

$$(۲) \dots \left(\frac{\text{مجهول (دلخواه)}}{\text{معلوم (حذف شده)}} \right) * \text{کمیت معلوم} = \text{کمیت مجهول}$$

نکته: برای تبدیل کمیت معلوم به کمیت مجهول ضریب تبدیل‌ها را به صورت حاصلضرب طوری کنارهم قرار می‌دهیم که واحدهای آنها با هم ساده شوند. همواره کمیت حذف شونده را (معلوم) در مخرج کسر قرار داده و کمیت مجهول (دلخواه) را در صورت کسر می‌گذاریم.

نکته: کمیت‌هایی که واحدشان کسری می‌باشد یک نوع ضریب تبدیل می‌باشند و می‌توان از آنها برای تبدیل یک کمیت به کمیت دیگر استفاده کرد. کمیت‌هایی از قبیل سرعت (m/s)، چگالی (g/L)، جرم مولی (g/mol)، حجم مولی (L/mol) و... از این نوع می‌باشند.

نمودار تبدیل مقادیر جرم، حجم، مول و تعداد ذره



مثال: یک نمونه ۲۰ ml از یک مایع با چگالی 0.2 g/ml چه جرمی دارد؟

مثال: 0,4 mol آب (H_2O) چند گرم جرم دارد؟ ($H = 1, O = 16 \text{ g.mol}^{-1}$)

مثال: 4.9g سولفوریک اسید (H_2SO_4) چند مول است؟ ($H = 1, S = 32, O = 16 \text{ g.mol}^{-1}$)

مثال: تعداد اتم‌های موجود در 3.2 مول هلیوم چند است؟

ذهن زیبا

مثال: حساب کنید هر 9.03×10^{22} اتم آهن، برابر چند مول آهن است؟ این مقدار آهن چه جرمی دارد؟ ($Fe = 56 \text{ g.mol}^{-1}$)

مثال: در 0.8 گرم متان (CH_4) چند اتم هیدروژن وجود دارد؟ ($C = 12, H = 1 \text{ g.mol}^{-1}$)

مثال: در صورتی که بخواهیم 12.04×10^{22} اتم اکسیژن داشته باشیم چند گرم فسفریک اسید (H_3PO_4) نیاز است؟

$$(H = 1, P = 31, O = 16 \text{ g.mol}^{-1})$$

مثال: 6.8 گرم آمونیاک (NH_3) دارای چند اتم هیدروژن است؟ ($H = 1, N = 14 \text{ g.mol}^{-1}$)

مثال: تعداد اتم‌های موجود در ۹۰ گرم از یک نمونه میسزیم نیترات ($Mg(NO_3)_2$) با تعداد اتم‌های فلئور موجود در چند گرم نیتروژن تری فلئور (NF_3) برابر است؟ ($Mg = 24, N = 14, O = 16, F = 19 \text{ g.mol}^{-1}$)

مثال: جرم 1.505×10^{23} مولکول از اکسید عنصر فسفر با فرمول کلی P_4O_y ، 7.1 گرم می‌باشد. مقدار y در این ترکیب کدام است؟ و در ۲۱۳ گرم از آن چند گرم اکسیژن وجود دارد؟ ($P = 31, O = 16 \text{ g.mol}^{-1}$)

ذهن زیبا

مثال: نسبت تعداد مولکول‌های SO_2 ۲۲۴g به تعداد اتم‌های N_2O_x ۲۷ برابر ۲ باشد، x کدام است؟ ($N = 14, O = 16, S = 32 \text{ g.mol}^{-1}$)

نور کلید شناخت جهان

به دلیل دوری خورشید و دیگر ستارگان از ما امکان اندازه گیری ویژگی های آنها به صورت مستقیم وجود ندارد. همچنین اندازه گیری دمای اجسام بسیار داغ با دماسنج عملی نیست. نور امکان یافتن پاسخ این پرسش ها را فراهم می آورد. **نوری که از ستاره ها یا سیاره های به ما می رسد، نشان می دهد که آن ستاره یا سیاره از چه ساخته شده و دمای آن چقدر است.**



نور خورشید اگرچه سفید به نظر می رسد، اما با عبور از قطره های آب موجود در هوا، که پس از بارش هنوز در هوا پراکنده است، تجزیه می شود و گستره ای پیوسته از رنگ ها را ایجاد می کند. این گستره ی رنگی، شامل بی نهایت طول موج از رنگ های گوناگون است.

اگر یک موج الکترومغناطیس (ترکیب یک موج الکتریکی و یک موج مغناطیسی) را در نظر بگیریم برای معرفی آن از پارامترهای زیر استفاده می کنیم.

طول موج (λ): فاصله دو قله متوالی

فرکانس (f): تعداد دفعاتی که یک موج از نقطه ای در یک ثانیه مشخص عبور می کند.

فرکانس و طول موج رابطه عکس دارند: $f = \frac{c}{\lambda}$



انرژی یک موج الکترومغناطیس با فرکانس آن رابطه مستقیم دارد. هرچه فرکانس بیشتر باشد، انرژی نیز بیشتر می شود.


پرتوهای مختلف طول موج های متفاوتی دارند. هرچه دما بیشتر باشد، طول موج کمتر (انرژی بیشتر) دارد.

نشر نور و طیف نشری


کشف طیف نشری خطی به **آتش بازی چینی ها** باز می گردد. آن ها از باروت سیاه استفاده می کردند. اگر براده بعضی از فلزات را به آن ها اضافه کنیم، نور ایجاد شده رنگی می شود. براده های **سدیم به رنگ زرد، مس به رنگ سبز و لیتیم سرخ** تولید می کنند. این موضوع پایه ای برای کشف طیف نشری خطی شد. (همچنین استفاده از ترکیب های دارای این فلزات نیز همین رنگ ها را به شعله می دهد.)

نکته: نور زرد لامپ‌های آزادراه‌ها به دلیل وجود **بخار سدیم** در آنهاست. همچنین از لامپ **نئون** در ساخت **تابلوهای تبلیغاتی** برای ایجاد نوشته‌های **نورانی** **سرخ‌فام** استفاده می‌شود.

شیمی‌دان‌ها به فرایندی که در آن یک ماده شیمیایی با جذب انرژی از خود، پرتوهای الکترومغناطیس گسیل می‌دارد، **نشر** می‌گویند. اگر نور نشر شده از یک ترکیب لیتیم‌دار در شعله را از یک منشور عبور دهیم، الگویی مانند شکل زیر بدست می‌آید که به آن طیف نشری خطی (زیرا فقط شامل **چهار** خط در ناحیه مرئی بوده و پیوسته نیست) لیتیم می‌گویند.



نکته: کاربرد طیف نشری خطی شبیه به بارکد روی جعبه یا بسته مواد غذایی و کالاهاست. با استفاده از بارکد می‌توان اطلاعات کامل کالا را بدست آورد. در مورد فلزات نیز به همین صورت است و با استفاده از آن می‌توان وجود یک فلز در یک ترکیب را مشخص کرد.



ذهن زیبا

کشف ساختار اتم


مدل اتمی بور

بعد از مشاهده طیف نشری خطی اتم هیدروژن و با توجه به اینکه هر نوار رنگی در طیف نشری خطی نوری با طول موج معین و انرژی معین را نشان می‌دهد، نیلز بور مدلی برای ساختار الکترونی این اتم ارائه کرد. از آنجا که هر نوار رنگی در این طیف نوری با طول موج و انرژی معین را نشان می‌دهد، نیلز بور بر این باور بود که از بررسی تعداد و جایگاه آنها، می‌توان اطلاعات ارزشمندی از ساختار اتم هیدروژن بدست آورد. مدل بور با موفقیت توانست طیف نشری خطی هیدروژن را توجیه کند اما توانایی توجیه طیف نشری خطی دیگر عناصر را نداشت.

مدل کوانتومی

دانشمندان برای توجیه ایجاد طیف نشری خطی دیگر عنصرها و نیز چگونگی نشر نور از اتم‌ها، **ساختاری لایه‌ای** برای اتم ارائه کردند. در این مدل اتم کره‌ای در نظر گرفته می‌شود که هسته در فضایی بسیار کوچک و در مرکز آن و الکترون‌ها در فضایی بسیار بزرگ‌تر و در لایه‌هایی پیرامون هسته توزیع می‌شوند.

عدد کوانتومی اصلی



در مدل کوانتومی لایه‌ها را از هسته به سمت بیرون شماره‌گذاری می‌کنند و شماره هر لایه را با n نمایش می‌دهند. n ، عدد کوانتومی اصلی نامیده می‌شود که برای لایه‌ی اول $n=1$ ، برای لایه دوم $n=2$ ، ... و برای لایه هفتم $n=7$ است.

$$n = 1, 2, 3, \dots, 7$$

در ساختار لایه‌ای اتم، مطابق شکل روبرو، هر بخش پررنگ، مهمترین بخش از یک لایه‌ی الکترونی را نشان می‌دهد. بخشی که الکترون‌های آن لایه، بیشتر وقت خود را در آن فاصله از هسته سپری می‌کنند، به این معنا که الکترون در هر لایه‌ای که باشد در همه نقاط پیرامون هسته حضور می‌یابد اما در محدوده یاد شده احتمال حضور بیشتری دارد.


به این نکته توجه شود که داد و ستد انرژی هنگام انتقال الکترون از یک لایه به لایه دیگر، به صورت **کوانتومی** است. در واقع این انتقال الکترون به صورت **پیمانه‌ای یا بسته‌های معین، جذب یا نشر می‌شود.**

در واقع تعداد این لایه‌ها در اتم محدود است و هر الکترون برای بالا رفتن در لایه‌ها (یا پایین آمدن) باید مقدار خاص و معینی از انرژی را دریافت (نشر) کند. از سوی دیگر هرچه مقدار انرژی جذب شده بیشتر باشد، الکترون‌ها به لایه‌های بالاتری انتقال می‌یابند.

با این توصیف انرژی داد و ستد شده هنگام انتقال الکترون‌ها در اتم، کوانتومی است که انرژی در پیمانه‌های معینی، جذب یا نشر می‌شود، به همین دلیل چنین ساختاری را برای اتم، **مدل کوانتومی اتم** نامیده‌اند. براساس این مدل، الکترون‌ها در هر لایه، آرایش و انرژی معینی دارند و اتم از **پایداری نسبی** برخوردار است که گفته می‌شود اتم در **حالت پایه** قرار دارد.




حالت برانگیخته



در این ساختار انرژی الکترون‌ها در اتم با افزایش فاصله از هسته افزایش می‌یابد. حال اگر به اتم‌ها در حالت پایه انرژی داده شود، الکترون‌های آنها با جذب انرژی به لایه‌های بالاتر انتقال می‌یابد. به اتم‌ها در چنین حالتی، اتم‌های برانگیخته می‌گویند.

اتم‌های برانگیخته پرنرژی‌تر، و ناپایدارند، از این رو تمایل دارند دوباره با از دست دادن انرژی به حالت پایدارتر و در نهایت به حالت پایه برگردند. از آنجا که برای الکترون، نشر نور، مناسب‌ترین شیوه برای از دست دادن انرژی است، الکترون‌ها در اتم برانگیخته، هنگام بازگشت به حالت پایه، نوری با طول موج معین نشر می‌کنند.



در شکل روبرو انتقال‌های الکترونی در اتم هیدروژن که منجر به نشر نور در ناحیه مرئی می‌شود را مشاهده می‌کنید. این انتقال‌ها از لایه‌های ۶، ۵، ۴، ۳ به ۲ است. که به ترتیب رنگ‌های بنفش، نیلی، آبی و قرمز دارند.

ارتباط مدل کوانتومی و جدول تناوبی

لایه‌های الکترونی به صورتی است که متناسب با جدول تناوبی باشد. به صورتی که در **تناوب اول جدول فقط لایه اول الکترون گرفته و در تناوب دوم، لایه دوم و در تناوب سوم لایه سوم الکترون می‌گیرد.**

همان‌گونه که می‌دانیم، در تناوب اول تنها ۲ عنصر هیدروژن و هلیم وجود دارد که اتم هر کدام تنها دارای یک لایه الکترونی است. این لایه نزدیک‌ترین لایه به هسته است و تنها می‌تواند ۲ الکترون را در خود جای دهد. در واقع لایه اول هم فقط گنجایش ۲ الکترون دارد، در نتیجه تناوب اول فقط دو عنصر دارد.

در تناوب دوم لایه اول پر بوده و لایه دوم در حال پر شدن است. با توجه به اینکه در تناوب دوم فقط ۸ عنصر وجود دارد، این لایه نیز حداکثر ۸ الکترون دارد.

عدد کوانتومی فرعی

هر لایه الکترونی از چند زیرلایه تشکیل شده است. زیرلایه‌ها را با نماد l نشان می‌دهند و به آن عدد کوانتومی فرعی می‌گویند. مقادیر مجاز آن به صورت زیر است:

$$l = 0, 1, \dots, n - 1$$

در واقع عدد کوانتومی اصلی تعداد زیر لایه‌ها را نیز نشان می‌دهد. لایه اول ($n = 1$) یک زیرلایه، لایه دوم ($n = 2$) دو زیرلایه و

به جای شماره برای زیرلایه‌ها می‌توان از نماد برای آنها استفاده کرد.

$$l = 0, s \quad l = 1, p \quad l = 2, d \quad l = 3, f$$

حداکثر گنجایش زیرلایه‌ها از رابطه $4l + 2$ بدست می‌آید.

در نتیجه برای زیرلایه‌ها داریم:

$$l = 0, s \rightarrow 2e^-, \quad l = 1, p \rightarrow 6e^-, \quad l = 2, d \rightarrow 10e^-, \quad l = 3, f \rightarrow 14e^-$$

به طور کلی برای نمایش یک زیرلایه از دو عدد کوانتومی n و l استفاده می‌شود. به عنوان مثال برای نمایش زیرلایه دوم ($l = 2$) از لایه سوم ($n = 3$) از نماد $3d$ استفاده می‌شود.

تست: کدام موارد از مطالب زیر، درست‌اند؟ (تجربی ۹۸)

(آ) طول موج نور بنفش از طول موج نور سبز، کوتاه‌تر است.

(ب) انرژی هر رنگ نور مرئی، با طول موج آن نسبت مستقیم دارد.

(پ) نوارهای رنگی در طیف نشری خطی اتم هیدروژن، ناشی از انتقال الکترون‌ها از لایه‌های بالاتر به لایه $n = 2$ است.

(ت) هرچه فاصله میان لایه‌های انتقال الکترون در اتم برانگیخته هیدروژن بیشتر باشد، طول موج نور، بلندتر است.

(۱) ب، پ، ت (۲) ب، ت (۳) آ، ب، پ (۴) آ، پ

تست: طیف نشری خطی کدام اتم در ناحیه مرئی، از خطوط بیشتری تشکیل شده است؟ (ریاضی ۹۸ خارج)

(۱) هلیم (۲) لیتیم (۳) سدیم (۴) هیدروژن

تست: کدام مطلب درست است؟ (تجربی ۹۹)

(۱) با دور شدن الکترون از هسته انرژی آن کاهش می‌یابد.

(۲) در همه اتم‌ها، تراز انرژی $n = 1$ ، حالت پایه به شمار می‌آید.

(۳) در طیف نشری خطی اتم هیدروژن، کمترین مقدار انرژی به نوار زرد رنگ مربوط است.

(۴) الکترون در حالت برانگیخته، ناپایدار است و با از دست دادن انرژی، همواره به حالت پایه باز نمی‌گردد.


تست: کدام مطلب، درباره اتم درست است؟ (ریاضی ۹۹ خارج)

(۱) انرژی لایه‌ها و تفاوت انرژی میان آن‌ها با دور شدن از هسته اتم بیشتر می‌شود.

(۲) اتم برانگیخته وضعیت ناپایداری دارد و با از دست دادن انرژی، همواره به حالت پایه برمی‌گردد.


(۳) هر عنصر، طیف نشری خطی ویژه خود را دارد که با تفسیر آن می‌توان به انرژی لایه‌های الکترونی اتم آن پی برد.

(۴) اگر طول موجو بازگشت الکترون از لایه چهارم به لایه سوم برابر 486nm باشد، طول موج بازگشت الکترون از لایه سوم به لایه دوم می‌تواند حدود 432nm باشد.



آرایش الکترونی اتم

نحوه پر شدن زیرلایه‌ها فقط به عدد کوانتومی اصلی وابسته نبوده و از یک قاعده کلی به نام قاعده آفبا پیروی می‌کند. مطابق این قاعده هنگام پر شدن زیرلایه‌ها، ابتدا آنها که به هسته نزدیک‌تر هستند الکترون گرفته و سپس زیرلایه‌های بالاتر پر خواهند شد. در واقع هر زیرلایه‌ای که به هسته نزدیک‌تر باشد، انرژی کمتری داشته و زودتر الکترون می‌گیرد.



برای تعیین انرژی زیرلایه‌ها به مجموع $n + l$ توجه می‌کنیم. هر

زیرلایه‌ای که مجموع کمتری داشته باشد زودتر پر می‌شود. اگر دو زیرلایه دارای $n + l$ برابر بودند، آن زیرلایه که n کوچکتر دارد، اول پر می‌شود.

فرم آفبا

$$/ns (n - 2)f (n - 1)d np/$$

$$n \geq 6 \quad n \geq 4 \quad n \geq 2$$

$$1s/2s, 2p/3s, 3p/4s, 3d, 4p/5s, 4d, 5p/6s, 4f, 5d, 6p/7s, 5f, 6d, 7p$$

نکته: زیرلایه s ($l = 0$) در تمام لایه ها وجود دارد. کوچکترین ضریب آن 1 می باشد. زیر لایه p به جز لایه اول در تمامی لایه ها وجود دارد و کوچکترین ضریب آن 2 است.

نکته: برای رسم آرایش الکترونی باید هر زیرلایه به ترتیب حداکثر تعداد الکترون ممکن را گرفته و بعد به سراغ زیرلایه بعدی برویم.

نکته: بعد از پرکردن زیرلایه ها با توجه به فرم آفبا، باید زیرلایه ها به ترتیب عدد کوانتومی اصلی (n) نوشته شود.

آرایش الکترونی هر یک از گونه های زیر را با استفاده از اصل آفبا رسم کنید.

$_{17}Cl :$


$_{31}Ga :$

$_{26}Fe :$

$_{33}As :$

$_{20}Ca :$

$_{83}Bi :$



رسم آرایش الکترونی با استفاده از گازهای نجیب

رسم آرایش الکترونی برای اتم هایی با عدد اتمی بزرگ کاری دشوار است. برای راحتی، سرعت عمل و دقت بالا می توانیم از گاز نجیب استفاده نماییم. در این روش نزدیکترین گاز نجیب قبل از اتم مورد نظر را نوشته و با توجه به شماره ی دوره گاز نجیب در فرم کلی آفبا عددی مناسب برای n قرار داده و زیرلایه های مورد نظر را می نویسیم، سپس باقی مانده الکترون ها را در این زیرلایه ها وارد می کنیم و در نهایت لایه ها را به صورت مکانی مرتب می کنیم.

$_{48}Cd :$

$_{50}Sn :$

$_{72}Hf :$

$_{82}Pb :$

قاعده آفبا آرایش الکترونی اتم اغلب عناصرها را پیش بینی می کند، اما برای اتم برخی عناصرهای جدول نارسایی دارد. امروزه به کمک روش های طیف سنجی پیشرفته آرایش الکترونی چنین اتم هایی را با دقت تعیین می کنند.

برای مثال اتم های **کروم** ($24Cr$) و **مس** ($29Cu$) دارای آرایش الکترونی متفاوتی هستند.

تعیین دوره و گروه عناصر

با استفاده از آرایش الکترونی می توان دوره و گروه عناصر را تعیین کرد. با دانستن گروه عناصر اطلاعات سودمندی درباره خواص و ویژگی های فیزیکی و شیمیایی عناصر بدست می آید.



جدول تناوبی

Key		Atomic #		Symbol		Exact Name																																																																																																													
1 H Hydrogen	2 He Helium	3 Li Lithium	4 Be Beryllium	5 B Boron	6 C Carbon	7 N Nitrogen	8 O Oxygen	9 F Fluorine	10 Ne Neon	11 Na Sodium	12 Mg Magnesium	13 Al Aluminum	14 Si Silicon	15 P Phosphorus	16 S Sulfur	17 Cl Chlorine	18 Ar Argon	19 K Potassium	20 Ca Calcium	21 Sc Scandium	22 Ti Titanium	23 V Vanadium	24 Cr Chromium	25 Mn Manganese	26 Fe Iron	27 Co Cobalt	28 Ni Nickel	29 Cu Copper	30 Zn Zinc	31 Ga Gallium	32 Ge Germanium	33 As Arsenic	34 Se Selenium	35 Br Bromine	36 Kr Krypton	37 Rb Rubidium	38 Sr Strontium	39 Y Yttrium	40 Zr Zirconium	41 Nb Niobium	42 Mo Molybdenum	43 Tc Technetium	44 Ru Ruthenium	45 Rh Rhodium	46 Pd Palladium	47 Ag Silver	48 Cd Cadmium	49 In Indium	50 Sn Tin	51 Sb Antimony	52 Te Tellurium	53 I Iodine	54 Xe Xenon	55 Cs Cesium	56 Ba Barium	*	71 Lu Lutetium	72 Hf Hafnium	73 Ta Tantalum	74 W Tungsten	75 Re Rhenium	76 Os Osmium	77 Ir Iridium	78 Pt Platinum	79 Au Gold	80 Hg Mercury	81 Tl Thallium	82 Pb Lead	83 Bi Bismuth	84 Po Polonium	85 At Astatine	86 Rn Radon	87 Fr Francium	88 Ra Radium	*	103 Lr Lawrencium	104 Rf Rutherfordium	105 Db Dubnium	106 Sg Seaborgium	107 Bh Bohrium	108 Hs Hassium	109 Mt Meitnerium	110 Ds Darmstadtium	111 Rg Roentgenium	112 Cn Copernicium	114 Fl Flerovium	116 Lv Livermorium	57 La Lanthanum	58 Ce Cerium	59 Pr Praseodymium	60 Nd Neodymium	61 Pm Promethium	62 Sm Samarium	63 Eu Europium	64 Gd Gadolinium	65 Tb Terbium	66 Dy Dysprosium	67 Ho Holmium	68 Er Erbium	69 Tm Thulium	70 Yb Ytterbium	89 Ac Actinium	90 Th Thorium	91 Pa Protactinium	92 U Uranium	93 Np Neptunium	94 Pu Plutonium	95 Am Americium	96 Cm Curium	97 Bk Berkelium	98 Cf Californium	99 Es Einsteinium	100 Fm Fermium	101 Md Mendelevium	102 No Nobelium

عناصر اصلی: اگر آخرین الکترون در یکی از زیر لایه های s یا p وارد شود، عنصر گروه اصلی می باشد. برای تعیین دوره آخرین ضریب زیر لایه s استفاده می شود و برای تعیین گروه از مجموع تعداد الکترون های زیر لایه های s و p استفاده می کنیم.

آرایش الکترونی لایه آخر	s^1	s^2	s^2p^1	s^2p^2	s^2p^3	s^2p^4	s^2p^5	s^2p^6
مجموع تعداد الکترون s و p	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸
شماره گروه	1	2	13	14	15	16	17	18

نکته: در اتم های اصلی الکترون های موجود زیر لایه های s و p لایه آخر به عنوان الکترون های لایه ظرفیت شناخته می شوند.

نکته: تنها استثنایی که این رابطه وجود دارد He است که آرایش $1s^2$ دارد ولی در گروه ۱۸ است.

عناصر واسطه: اگر آخرین الکترون در زیر لایه d یا f وارد شود، واسطه یا فرعی است. اگر آخرین الکترون در d وارد شود واسطه خارجی و اگر در f وارد شود، واسطه داخلی است. برای تعیین دوره به آخرین ضریب زیر لایه s توجه می کنیم و برای تعیین گروه در عناصر واسطه خارجی به مجموع s و d توجه می کنیم.

آرایش الکترونی لایه آخر	s^2d^1	s^2d^2	s^2d^3	s^1d^5	s^2d^5	s^2d^6	s^2d^7	s^2d^8	s^1d^{10}	s^2d^{10}
s و d مجموع تعداد الکترون	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
شماره گروه	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

نکته: در اتم های واسطه الکترون های موجود زیر لایه های s و d لایه آخر به عنوان الکترون های ظرفیت شناخته می شوند.

نکته مهم: اگر در یک اتم صحبت از آخرین زیر لایه (دورترین زیر لایه) شد، منظور زیر لایه با بزرگترین عدد کوانتومی اصلی است. در واقع این موضوع زمانی اهمیت پیدا می کند که بدانیم مثلا در عناصر واسطه آخرین زیر لایه، s است و نه d. زیرا زیر لایه s بعد از گرفتن الکترون از نظر سطح انرژی بالاتر از زیر لایه d قرار خواهد گرفت. به عنوان مثال در آرایش الکترونی اتم ^{25}Mn درست تر است که آرایش الکترونی به صورت $[18Ar]3d^54s^2$ نوشته شود.

نکته مهم: در مورد آرایش الکترونی عناصر ۲۱ تا ۳۰ جدول تناوبی (تناوب چهارم، ردیف اول واسطه) می توان به سادگی و سریع با توجه به عدد اتمی آنها آرایش الکترونی آنها را رسم کرد. در این عناصر رقم یکان عدد اتمی تعداد الکترون های زیر لایه d و رقم دهگان هم که ۲ می باشد، تعداد الکترون s را نشان می دهد. البته در این مورد باید به دو عنصر استثنا ^{29}Cu و ^{24}Cr حتما توجه شود.

نکته بسیار مهم: برای رسم آرایش الکترونی عناصر بلوک p (عناصر گروه‌های ۱۳ تا ۱۸) می‌توان به جای استفاده از گاز نجیب قبلی از گاز نجیب بعدی استفاده کرد. این کار باعث می‌شود که بتوان برای بدست آوردن آرایش لایه ظرفیت عناصر بلوک p زمانی کمتر از ۵ ثانیه! نیاز باشد.

باید توجه داشت که آرایش الکترونی تمام گازهای نجیب (به جز هلیم) به ns^2sp^6 ختم می‌شود. در نتیجه با توجه به اینکه عدد اتمی مورد نظر چندتا با گاز نجیب هم دوره خود فاصله دارد، به همان تعداد از تعداد الکترون‌های زیرلایه p آن کم می‌کنیم. همچنین برای تعیین n در این آرایش الکترونی از شماره تناوب همان گاز نجیب استفاده می‌شود.



تست: در چند اتم عنصرهای واسطه تناوب چهارم، زیرلایه $3d$ به ترتیب پر و نیم پر شده است؟ (ریاضی ۸۸)

۲-۲(۱) ۲-۳(۲) ۳-۲(۳) ۱-۱(۴)

تست: اگر تفاوت عدد اتمی و شمار نوترون‌های اتم عنصر A برابر با ۱۰ باشد، کدام بیان درباره این عنصر درست است؟ (ریاضی ۸۹)

(۱) عنصری گازی از گروه ۱۷ است. (۲) عنصری اصلی از گروه ۱۵ جدول تناوبی است.

(۳) آرایش الکترونی لایه ظرفیت اتم آن $4s^24p^4$ است. (۴) با فلزهای قلیایی (M) ترکیب یونی با فرمول عمومی MA می‌دهد.

ذهن زیبا

تست: با توجه به ارتباط عدد اتمی عنصرها با موقعیت آنها در جدول تناوبی، کدام عنصر، یک عنصر اصلی است؟ (ریاضی ۹۰)

۲۸X(۱) ۲۹A(۲) ۳۱D(۳) ۳۹M(۴)

تست: اگر عنصر E از گروه ۱۵ با عنصر G که عدد اتمی آن برابر ۳۴ است، هم دوره باشد، عدد اتمی عنصر E کدام است و در بیرونی‌ترین زیر لایه الکترونی آن، چند الکترون وجود دارد؟ (ریاضی ۹۰)

۳-۳۳(۱) ۳-۳۵(۲) ۵-۳۳(۳) ۵-۳۵(۴)

تست: با توجه به ارتباط آرایش الکترونی اتم عنصرها با موقعیت آنها در جدول تناوبی، آرایش الکترونی لایه ظرفیت عنصری که هم‌گروه $51Sb$ است و در دوره چهارم جای دارد، کدام است؟ (تجربی ۹۰)

۴s²4p³(۲) ۴s²4p⁵(۱) ۵s²5p³(۳) ۵s²5p⁵(۴)

تست: کدام بیان درباره عنصر $34M$ نادرست است؟ (تجربی ۹۱)

(۱) عنصری اصلی است و در گروه ۱۶ جای دارد.

(۲) آرایش الکترونی لایه ظرفیت اتم آن $4s^2 4p^2$ است.

(۳) با عنصر $19X$ در یک دوره از جدول تناوبی جای دارد.

(۴) اتم آن ۱۰ الکترون با عدد کوانتومی $l = 2$ دارد.

تست: آرایش الکترونی کدام اتم نادرست است اما شماره دوره و گروه آن در جدول تناوبی درست بیان شده است؟ (ریاضی ۹۱ خارج)

(۱) $24Cr: [18Ar] 3d^5 4s^1$ - چهارم - ۶

(۳) $53I: [36Kr] 4d^{10} 5s^2 5p^3$ - پنجم - ۱۷

(۲) $47Ag: [36Kr] 4d^{10} 5s^1$ - پنجم - ۱۱

(۴) $32Ge: [18Ar] 3d^{10} 4s^2 4p^4$ - چهارم - ۱۶

تست: اگر اتم عنصری دارای ۱۷ الکترون با عدد کوانتومی $l = 1$ باشد، آخرین زیرلایه اشغال شده اتم آن دارای الکترون است و این عنصر در دوره ی و گروه جدول تناوبی جای دارد. (تجربی ۹۱ خارج)

(۱) - چهارم - ۱۷ (۲) - پنجم - ۱۴ (۳) - پنجم - ۱۴ (۴) - چهارم - ۱۷

ذهن زیبا

تست- اگر شمار الکترون های زیرلایه $4s$ اتم عنصر A دو برابر شمار الکترون های این زیر لایه در اتم عنصر B و شمار الکترون های زیرلایه $3d$ اتم آن نصف شمار الکترون های این زیرلایه در اتم B باشد، A و B به ترتیب از راست به چپ، کدام دو عنصر در دوره چهارم جدول تناوبی اند؟ (ریاضی ۹۲)

$30Zn, 25Mn$ (۴)

$30Zn, 24Cr$ (۳)

$29Cu, 25Mn$ (۲)

$29Cu, 24Cr$ (۱)

تست: عنصری که در دوره ی چهارم و گروه ۱۷ جدول تناوبی جای دارد، به ترتیب از راست به چپ، چند الکترون با عدد کوانتومی $l = 1$ دارد و چند الکترون در آخرین زیرلایه اشغال شده ی آن جای دارد؟ (تجربی ۹۲ خارج)

۵ - ۱۷ (۴)

۳ - ۱۷ (۳)

۵ - ۱۵ (۲)

۳ - ۱۵ (۱)

تست: عنصر $52A$ با عنصر در جدول تناوبی هم گروه است و آخرین زیرلایه اشغال شده اتم آن، است و یک به حساب می آید. (تجربی ۹۳)

(۱) $34X$ ، شبه فلز $4p^4$ (۲) $32Y$ ، نافلز $4p^2$ (۳) $34X$ ، شبه فلز $5p^4$ (۴) $32Y$ ، نافلز $5p^2$

تست: کدام عنصر در جدول تناوبی با نیکل ($28Ni$) هم گروه است؟ (تجربی ۹۳ خارج)

(۱) $42Mo$ (۲) $46Pd$ (۳) $48Cd$ (۴) $56Ba$

تست: در میان چهار عنصر $13A$ ، $19X$ ، $31Y$ و $36D$ کدام دو عنصر به ترتیب در یک دوره و کدام دو عنصر در یک گروه از جدول تناوبی جای دارند؟ (ریاضی ۹۳ خارج)

(۱) A و D و Y (۲) A و X و Y و D (۳) X و A و Y و D (۴) X و A و D و Y

تست: عنصر واسطه‌ای که شمار الکترون‌های زیر لایه $3d$ با $4s$ در اتم آن برابر است، در کدام گروه جدول تناوبی جای دارد؟ (ریاضی خارج ۹۴)

(۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴) ۶

تست: اتمی که دارای الکترونی با عددهای کوانتومی $n = 4$ و $l = 3$ است. در کدام دوره جدول تناوبی جای دارد؟ (تجربی ۹۵)

(۱) چهارم (۲) پنجم (۳) ششم (۴) هفتم


تست: اگر عنصر $32A$ با عنصر X از گروه ۱۵ جدول تناوبی هم دوره باشد، عنصر A در کدام گروه جدول تناوبی جای دارد و عدد اتمی عنصر X کدام است؟ (تجربی ۹۵)

(۱) سیزدهم، ۳۱ (۲) سیزدهم، ۳۳ (۳) چهاردهم، ۳۱ (۴) چهاردهم، ۳۳

تست: در اتم کدام عنصر (به ترتیب از راست به چپ) شمار الکترون‌های زیر لایه‌های 3d و 3p برابر و در اتم کدام عنصر، شمار الکترون‌های زیر لایه 3d با شمار الکترون‌های زیر لایه 4s برابر است؟ (ریاضی ۹۵ خارج)



تست: گازهای نجیب در کدام گروه جدول تناوبی عنصرها، جای دارند و تفاوت عدد اتمی گاز نجیب دوره اول و دوره سوم کدام است؟ (ریاضی ۹۶)



تست: عنصری که آخرین لایه الکترونی اشغال شده اتم آن $4s^2 4p^3$ است، در کدام گروه و کدام دوره جدول تناوبی جای دارد؟ (ریاضی ۹۶)



تست: کدام مطلب درباره جدول تناوبی عنصرها درست است؟ (ریاضی ۹۶)

(۱) آخرین عنصر واسطه هر دوره در گروه ۱۰ جای دارد.

(۲) نخستین عنصر گروه‌های ۱۴ تا ۱۸ در شرایط معمولی گازند.

(۳) آخرین زیرلایه اشغال شده اتم عنصرهای واسطه دارای ۲ الکترون است.

(۴) در عنصرهای گروه ۱۷، با افزایش عدد اتمی، تمایل به گرفتن الکترون و واکنش‌پذیری کاهش می‌یابد.

ذهن زیبا

تست: انرژی لازم برای جدا کردن یک الکترون از اتم هلیوم برابر $2350 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ است. انرژی این فرایند وقتی الکترون‌ها قبلاً به لایه سوم آن برانگیخته شده باشند، حدود $1350 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ و هنگامی که الکترون‌ها قبلاً به لایه دوم برانگیخته شده باشند، برابر $1550 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ است. تفاوت

انرژی لایه‌های اول و سوم این عنصر، چند برابر تفاوت انرژی لایه‌های اول و دوم است؟ (تجربی ۹۶ با اندکی تغییر)



تست: جدول تناوبی عنصرها (به ترتیب از راست به چپ) دارای چند دوره و چند گروه است؟ (تجربی ۹۶ خارج)



تست: فلزهای واسطه در هر دوره از جدول تناوبی، در کدام گروه‌ها جای دارند و کوچکترین عدد اتمی ممکن برای این فلزات، کدام است؟ (ریاضی ۹۶ خارج)

۲۲ تا ۲(۴) - ۱۲

۲۲ تا ۳(۳) - ۱۲

۲۱ تا ۲(۲) - ۱۲

۲۱ تا ۳(۱) - ۱۲

تست: کدام سه عنصر در زیرلایه p بالاترین لایه اشغال شده اتم خود، الکترون ندارند؟ (تجربی ۹۷)

${}_{36}E, {}_{31}Z, {}_{21}M$ (۴)

${}_{36}E, {}_{30}X, {}_{21}M$ (۳)

${}_{39}G, {}_{31}Z, {}_{27}A$ (۲)

${}_{39}G, {}_{30}X, {}_{27}A$ (۱)

تست: در چهارمین لایه الکترونی اتم عنصرها، مقدار برای عدد کوانتومی l و در کل حداکثر الکترون وجود دارد و عنصرهایی که آخرین الکترون آنها در زیرلایه‌های مربوط به این لایه قرار می‌گیرند، در دوره مختلف جدول تناوبی جای دارند. (تجربی ۹۷ خارج)

سه (۴) - ۱۸ - ۳

دو (۳) - ۱۸ - ۳

دو (۲) - ۳۲ - ۴

دو (۱) - ۳۲ - ۴

تست: آرایش الکترونی لایه آخر اتم کدام عنصر، مشابه با آرایش الکترونی لایه ظرفیت اتم ${}_{19}K$ است؟ (ریاضی ۹۸)

${}_{31}Z$ (۴)

${}_{27}X$ (۳)

${}_{21}D$ (۲)

${}_{29}A$ (۱)

تست: کدام موارد از مطالب زیر، درست‌اند؟ (ریاضی ۹۸ خارج)

ذهن زیبا

(ب) ترتیب پرشدن زیرلایه‌ها، تنها به عدد کوانتومی اصلی (n) وابسته است.

(پ) در سومین دوره جدول دوره‌ای (تناوبی)، ۱۸ عنصر جای دارند که از میان آنها دو عنصر گازی‌اند.

(ت) در اتم عنصرهای دوره سوم جدول دوره‌ای (تناوبی)، زیر لایه‌های ۳s، ۳p و ۳d را دربردارد.

(۴) آ، ب، ت


(۳) آ، پ، ت

(۲) ب، پ

(۱) آ، ت

تست: اگر دایره‌های تیره رنگ در شکل زیر، نشان دهنده لایه‌های الکترونی اتم عنصر A باشد، چند مورد از مطالب زیر، درباره آن درست است؟ (تجربی

۹۸ خارج)



- A عنصری اصلی از گروه ۱۵ است.
- برخی از ترکیب‌های آن، رنگی هستند.
- بالاترین عدد اکسایش آن برابر ۷ است.
- سه زیر لایه از لایه سوم آن از الکترون اشغال شده است.

۱(۱) ۲(۲) ۳(۳) ۴(۴)

تست: چند مورد از مطالب زیر درست است؟ (ریاضی ۹۹)

- جرم اتمی 1_1H اندکی از ۱ amu بیشتر است.
- عنصر ${}_{35}X$ با عنصر ${}_{17}Z$ هم گروه و با عنصر ${}_{21}Y$ هم دوره است.
- در تناوب سوم جدول تناوبی، پنج عنصر جای دارند که نماد شیمیایی آنها، دو حرفی است.
- هر ستون جدول تناوبی، شامل عنصرهایی با خواص فیزیکی و شیمیایی یکسان است و گروه نامیده می‌شود.

۱(۱) ۲(۲) ۳(۳) ۴(۴)

تست: $n + l$ برای a الکترون ظرفیتی اتم کروم (${}_{24}Cr$) برابر m است و برای b الکترون ظرفیتی دیگر، برابر x است. a، m، b و x، به ترتیب از راست به چپ کدام عددها می‌توانند باشند؟ (ریاضی ۹۹)

۱(۱) ۵، ۵، ۴، ۱ ۲(۲) ۵، ۴، ۴، ۲ ۳(۳) ۵، ۴، ۵، ۲ ۴(۴) ۵، ۴، ۵، ۱





ذهن زیبا

تست: چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ (ریاضی ۹۹ خارج)

- در عنصرهای اصلی، به لایه آخر هر اتم، لایه ظرفیت گفته می‌شود.
- انرژی زیرلایه ۵d از زیرلایه ۶p کم‌تر و از زیرلایه ۴f بیشتر است.
- عنصری که اتم آن در لایه ظرفیت خود الکترون بیشتری دارد، واکنش پذیری بیشتری دارد.
- گنجایش الکترونی زیر لایه $l = 4$ یک اتم، با شمار عنصرهای دوره پنجم جدول تناوبی، برابر است.
- دو یا چند عنصر که شمار الکترون‌های ظرفیتی آنها برابر باشد، در یک گروه جدول تناوبی جای دارند.

۱(۱) ۲(۲) ۳(۳) ۴(۴)

تست: در اتم کدام عنصر، شمار الکترون‌های دارای عدد کوانتومی $l = 1$ ، برابر مجموع شمار الکترون‌های دارای عددهای کوانتومی $l = 0$ و $l = 2$ است و شمار الکترون‌های ظرفیتی این عنصر، با شمار الکترون‌های لایه ظرفیت اتم کدام عنصر، برابر است؟ (گزینه‌ها را از راست به چپ بخوانید). (تجربی ۹۹ خارج)



ساختار اتم و رفتار آن


می‌دانیم گازهای نجیب به صورت تک اتمی هستند و واکنش پذیری بسیار کمی دارند.

این موضوع به آرایش الکترونی کاملاً بر آن‌ها ارتباط دارد. به طور کلی یک آرایش الکترونی کاملاً پر، پایدارتر از آرایش‌های دیگر است. در واقع در تمام گازهای نجیب هشت الکترون وجود دارد. (به جز هلیم که در تنها لایه الکترونی خود فقط ۲ الکترون دارد). پس به طور کلی اگر آرایش الکترونی یک گونه به صورت هشت‌تایی باشد، پایداری بیشتری خواهد داشت.

لوویس برای توضیح و پیش‌بینی رفتار اتم‌ها، آرایش الکترون-نقطه‌ای را ارائه کرد که در آن الکترون‌های ظرفیت هر اتم، پیرامون نماد شیمیایی آن با نقطه نمایش داده می‌شود. برای هر اتم به تعداد الکترون‌های لایه ظرفیت باید الکترون اطراف آن قرار دهیم.

رفتار هر اتم به تعداد الکترون‌های لایه ظرفیت آن بستگی دارد، به طوری که می‌توان هشت‌تایی شدن لایه ظرفیت و دستیابی به آرایش گاز نجیب را مبنای میزان واکنش‌پذیری آنها دانست. در واقع اتم‌ها می‌توانند با دادن الکترون، گرفتن الکترون و نیز به اشتراک گذاشتن آن به آرایش یک گاز نجیب برسند و پایدار شوند.


به عنوان مثال در تهیه سدیم کلرید از اتم‌های فلز سدیم و گاز کلر، اتم سدیم (اتم فلز) یک الکترون از دست داده و به یون سدیم مثبت (Na^+) تبدیل شده و اتم کلر (اتم نافلز) این الکترون را گرفته و به یون کلرید (Cl^-) تبدیل می‌شود.




با توجه به آرایش الکترونی اتم‌های سدیم و کلر در می‌یابیم که سدیم با ازدست دادن یک الکترون و کلر با گرفتن یک الکترون به آرایش پایدار هشت‌تایی می‌رسد.

آرایش الکترونی یون ها




۱- آنیون ها: آنیون های پایدار تک اتمی آرایش الکترونی شان به گاز نجیب هم دوره ی خود می رسد. فقط کافی است عدد اتمی را با قدر مطلق بار یون جمع کنیم تا عدد اتمی گاز نجیب مربوطه بدست آید.



۲- کاتیون ها: برخی از کاتیون ها به آرایش گاز نجیب قبل از خود می رسند. آرایش این یون ها همان آرایش گاز نجیب مربوطه است. عناصر فلزات قلیایی، فلزات قلیایی خاکی (به جز Be)، Sc، Al یون هایی با آرایش گاز نجیب تشکیل می دهند.



نکته: اغلب کاتیون های فلزی به آرایش گاز نجیب نمی رسند، برای رسم آرایش الکترونی این نوع یون ها ابتدا آرایش اتم خنثی را رسم کرده و سپس با توجه به بار یون با اولویت مکانی از زیر لایه ها الکترون جدا می کنیم. زیرلایه ای که ضریب بزرگتر داشته باشد و دورتر از هسته باشد زودتر الکترون از دست می دهد.






ذهن زیبا


نکته: در آرایش الکترونی یون ها و اتم ها منظور از آخرین زیرلایه یا آخرین تراز همان زیرلایه با بزرگترین ضریب (n) می باشد. به عبارتی آخرین زیرلایه دورترین زیرلایه از نظر مکانی نسبت به هسته می باشد.

تعیین عدد اتمی با توجه به آرایش الکترونی و بار یون

با داشتن آرایش الکترونی یون تعداد الکترون های موجود در یون را بدست می آوریم. سپس به تعداد بار مثبت یا منفی به الکترون های آن اضافه یا کم می کنیم تا عدد اتمی بدست آید.



آنیون ها و کاتیون هایی که به آرایش گاز نجیب می رسند، آخرین ترازشان به np^6 ختم می شود. برای تعیین شماره دوره و گروه اتم مورد نظر با استفاده از الگوی ساده زیر استفاده می کنیم:



نکته: اگر آرایش الکترونی یک ذره به np^6 ختم شود، آن ذره می تواند گاز نجیب، آنیون و یا کاتیون باشد.

آرایش الکترون نقطه ای ۱۸ عنصر اول جدول

۱								۱۸
H·								He:
۲			۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	
Li·	Be·		·B·	·C·	·N·	·O·	·F·	·Ne:
Na·	Mg·		·Al·	·Si·	·P·	·S·	·Cl·	·Ar:

یون های متداول ۳۶ عنصر اصلی جدول

۱								۱۸
								He
۲			۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	
Li ⁺					N ³⁻	O ²⁻	F ⁻	Ne
Na ⁺	Mg ²⁺		Al ³⁺		P ³⁻	S ²⁻	Cl ⁻	Ar
K ⁺	Ca ²⁺						Br ⁻	Kr


تست: آرایش الکترونی کدام گونه شیمیایی با آرایش الکترونی هر یک از سه گونه دیگر تفاوت دارد؟ (ریاضی ۸۹)




تست: اگر شمار الکترون‌های یون تک اتمی M^{+} برابر ۳۶ باشد، عنصر M در دوره جدول تناوبی جای داشته، عدد اتمی آن برابر است و با گوگرد ترکیبی با فرمول تشکیل می‌دهد. (ریاضی ۸۹)



تست: اگر تفاوت شمار الکترون‌ها و نوترون‌ها در یون تک اتمی $^{207}M^{2+}$ برابر ۴۵ باشد، عنصر M در کدام دوره و کدام گروه جدول تناوبی جای دارد؟ (تجربی ۹۰)




تست: کدام آرایش الکترونی را می‌توان هم به یک اتم خنثی هم به یک کاتیون و هم به یک آنیون به پایدار نسبت داد؟ (تجربی خارج ۹۱)



تست: کدام سه گونه شیمیایی، آرایش الکترونی یکسانی دارند؟ (تجربی ۹۲)

ذهن زیبا



تست: آرایش الکترونی کاتیون $^{65}Zn^{2+}$ به ترتیب از راست به چپ با آرایش الکترونی کدام گونه یکسان بوده و شمار نوترون‌های آن با کدام گونه برابر است؟ (ریاضی ۹۴ خارج)



تست: اگر عنصری در گروه ۱۵ با عنصری که بیرونی ترین زیرلایه اتم آن $4p^5$ است هم دوره باشد، کدام مطالب زیر، درباره آن درست اند؟ (تجربی ۹۶ خارج با اندکی تغییر)

(آ) عدد اتمی آن ۳۳ است.

(ب) بیرونی ترین لایه اتم آن ۷ الکترون دارد

(پ) ۸ زیرلایه در آن از الکترون پر شده است.

(ت) در ساختار الکترون نقطه آن ۳ الکترون تکی وجود دارد.





(۴) آ، ت

(۳) ب، پ، ت





(۲) ب، پ

(۱) آ، ب

تست: در کدام گزینه، آرایش الکترونی کاتیون و آنیون در هر دو ترکیب مشابه آرایش الکترونی اتم گاز نجیب دوره ی سوم جدول تناوبی است؟ (عدد اتمی سدیم، منیزیم، گوگرد، کلر، کلسیم و برم به ترتیب برابر ۱۱، ۱۲، ۱۶، ۱۷، ۲۰، ۳۵ است.) (تجربی ۹۵ خارج)



تست: در بالاترین لایه اشغال شده کدام یون گازی، هشت الکترون وجود دارد؟ (ریاضی ۹۶ داخل)



تست: اگر تفاوت شمار الکترون ها و نوترون های یون تک اتمی ${}^{79}X^{3-}$ برابر ۱۰ باشد، در بیرونی ترین زیرلایه اتم آن الکترون جای دارد و عدد اتمی عنصر X، برابر است. (ریاضی ۹۷ خارج)





$33 - 5$ (۴)

$31 - 5$ (۳)

$33 - 3$ (۲)

$31 - 3$ (۱)

تست: شمار پروتون های یون ${}^{72}M^{2+}$ برابر ۰.۸ شمار نوترون های آن است. عنصر M با کدام عنصر در جدول تناوبی هم دوره است و در این یون چندی لایه از الکترون پر شده است؟ (ریاضی ۹۹)



نکته: ترکیبات یونی که تنها از دو عنصر ساخته شده‌اند، ترکیب یونی دوتایی نامیده می‌شود. مانند $CaCl_2, Na_3N, \dots$

نکته مهم: ترکیبات یونی مولکول ندارند. در این ترکیبات، میلیاردها میلیارد یون ناهمنام در کنار یکدیگر در یک شبکه منظم به صورتی چیده شده‌اند که جاذبه حداکثر و دافعه حداقل شود. در واقع وقتی ترکیب MgF_2 را بررسی می‌کنیم اینگونه نیست که فقط دو تا یون F^- و یک یون Mg^{2+} کنار هم قرار گرفته باشند. بلکه بینهایت یون مثبت و منفی به صورتی که کنار هم قرار گرفته‌اند که نسبت آنیون به کاتیون در آنها ۲ به ۱ است. در ادامه شیوه فرمول نویسی و نام‌گذاری کلی ترکیبات یونی را آورده‌ایم.

فرمول نویسی و نام‌گذاری

نوشتن فرمول ترکیب یونی دوتایی

1- نشانه‌ی فلز را در سمت چپ و نشانه‌ی نافلز را در سمت راست می‌نویسیم، به عبارتی کاتیون‌ها در سمت چپ نوشته و آنیون در سمت راست نوشته می‌شود.



2- ظرفیت یک عنصر یا یون را ضریب عنصر یا یون دیگر و برعکس می‌نویسیم.

3- چنانچه ضرایب قابل ساده کردن باشد آن‌ها را ساده می‌کنیم، از نوشتن و خواندن ضریب 1 صرف نظر می‌کنیم.

مثال :

(Mg^{2+}, Cl^-)	(Al^{3+}, N^{3-})
(Sc^{3+}, F^-)	(Na^+, O^{2-})
(K^+, NO_3^-)	(Mg^{2+}, O^{2-})
(Fe^{2+}, PO_4^{3-})	(Al^{3+}, SO_4^{2-})

نام‌گذاری ترکیبات دوتایی

الف) ترکیبات دوتایی فلز با نافلز: همانطور که در یک فرمول از چپ می‌نویسیم از چپ نیز می‌خوانیم، ابتدا نام فلز سپس نام نافلز و یا ریشه‌ی آن همراه پسوند (ید) می‌نویسیم.

نام نافلزها و ظرفیت آنها با پسوند «ید»

N^{3-} :	P^{3-} :	O^{2-} :	S^{2-} :
F^- :	Cl^- :	Br^- :	I^- :

(Sc, F): ScF_3 پتاسیم کلرید (K, Cl): KCl کلسیم سولفید (Ca, S): CaS اسکاندیم فلئورید (Sc, F): ScF_3

(Mg, Cl): (Al, F): (Na, S):

نکته: اغلب فلزات واسطه ظرفیت متغیر دارند و در هنگام نامگذاری این ترکیبات، ظرفیت فلز در ترکیب با نماد یونانی در کنار آن نوشته می‌شود.

اعداد یونانی به صورت زیر هستند:

دکا: X نونا: IX اوکتا: VIII هپتا: VII هگزا: VI پنتا: V تترا: IV تری: III دی: II مونو: I

نکته: عناصر مهم که دارای ظرفیت متغیر هستند عبارت اند از:

$V, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Pb, Sn, Hg$

همچنین عناصر گروه ۱، ۲، Sc و Al دارای ظرفیت ثابت ۱، ۲، ۳، ۳، ۳ بوده و همچنین عناصر روی (Zn) و کادمیم (Cd) دارای ظرفیت ثابت ۲ و نقره (Ag) دارای ظرفیت ۱ می‌باشند.

مثال: نام ترکیبات زیر را بنویسید.

Fe^{2+}, S^{2-} :

Cu^{2+}, F^{-} :

Zn^{2+}, Br^{-} :

Cu^{+}, F^{-} :

Pb^{2+}, O^{2-} :

Fe^{3+}, Cl^{-} :

Pb^{4+}, O^{2-} :

Fe^{2+}, Cl^{-} :

Mn^{2+}, O^{2-} :

Mn^{4+}, O^{2-} :

تست: آرایش الکترونی کاتیون در $CoCl_3$ ، کدام است؟ (کبالت در دوره چهارم و گروه ۹ جدول تناوبی جای دارد.) (ریاضی ۹۱)

$[18Ar]3d^6(۲)$

$[18Ar]3d^7(۱)$

$[18Ar]4s^24p^5(۴)$

$[18Ar]4s^24p^4(۳)$

تست: عنصر X با ید ($53I$) هم دوره و با کربن ($6C$) در جدول تناوبی هم گروه است. کدام گزینه درباره‌ی آنها نادرست است؟ (تجربی ۹۳)
 (۱) عدد اتمی آن برابر ۵۰ است.

(۲) اکسیدهایی با فرمول عمومی XO و XO_2 تشکیل می‌دهد.

(۳) در ساختار الکترون نقطه‌ای آن ۴ الکترون تکی وجود دارد.

(۴) عنصری از گروه ۱۴ است و یون پایدار X^{4+} با آرایش الکترونی مشابه گاز نجیب $36Kr$ تشکیل می‌دهد.

تست: عنصر A با عدد اتمی ۳۸ به احتمال زیاد با عنصر X با عدد اتمی واکنش داده و ترکیب با فرمول تشکیل می‌دهد. (تجربی ۹۳)




(۱) $35A_2X$ - کووالانسی - A_2X (۲) $35AX_2$ - یونی - AX_2 (۳) $16AX_2$ - کووالانسی - AX_2 (۴) $16A_2X$ - یونی - A_2X

تبدیل اتم‌ها به مولکول‌ها

می‌دانیم که در تمام ترکیبات، اتم‌ها با داد و ستد الکترون به آرایش هشت‌تایی نمی‌رسند.

به عنوان مثال با توجه به آرایش الکترون نقطه‌ای کلر، در مولکول دو اتمی گاز کلر (Cl_2) (که خاصیت رنگ‌بری و گندزدایی دارد) امکان اینکه با جابجایی الکترون به آرایش هشت‌تایی برسیم وجود ندارد، زیرا هر دو اتم کلر نیاز به یک الکترون دارند. در نتیجه می‌توانند با اشتراک گذاشتن یک الکترون هر دو اتم به آرایش هشت‌تایی برسند.

ذهن‌زیا



در این حالت در واقع الکترون‌های اشتراکی برای هر دو اتم به حساب می‌آید.

نکته: هر اتم به تعداد الکترون‌های تکی که می‌تواند تشکیل دهد، پیوند کووالانسی ایجاد می‌کنند.

نکته: به فرمول شیمیایی که افزون بر نوع عنصرهای سازنده، شمار اتم‌های هر عنصر را نشان می‌دهد، فرمول مولکولی می‌گویند.

رسم ساختار لوویس

تعیین اتم مرکزی

برای تعیین اتم مرکزی از قواعد ساده زیر استفاده می کنیم:

الف) اتمی که ظرفیت بیشتری دارد اتم مرکزی است (معمولا اتم مرکزی کمترین تعداد را در فرمول بسته دارد).

ب) در اتم های هم گروه اتم بزرگتر که در گروه پایین تر قرار می گیرد اتم مرکزی خواهد بود.

نکته: اتم های H و F همیشه وصل شونده بوده و اتم مرکزی نمی باشند.

پس از تعیین اتم مرکزی باید تلاش کنیم که با برقراری پیوند بین اتم مرکزی و اتم های اطراف تمام اتم ها تا حد امکان هشت تایی شوند و همچنین هیچ تک الکترونی پس از رسم ساختار برای اتم ها باقی نماند. (در تمام این موارد استثناء نیز وجود دارد)

H_2O	PH_3
CO_2	COF_2
O_2	N_2
NH_3	H_2S
CS_2	HCN
$COCl_2$	CH_4

تعیین تعداد پیوندها بدون رسم ساختار لوویس

برای این منظور در صورتی که بدانیم ترکیب مورد نظر قائده هشت تایی را رعایت کرده است به راحتی می توان با استفاده از قاعده ساده زیر تعداد پیوندها را پیدا کرد:

$$\text{تعداد پیوند} = \frac{\text{بار یون} + \text{مجموع تعداد الکترونی که اتم‌های ترکیب از هشت تایی کم دارند (برای هیدروژن دو تایی)}}{2}$$

مثال: برای گونه‌های $PO_4^{3-}, CO_2, HCN, COCl_2$ تعداد پیوندها را مشخص کنید.

همچنین در صورتی که تعداد الکترون‌های غیرپیوندی یک ترکیب مد نظر باشد، بازهم در صورتی که بدانیم قاعده هشت تایی رعایت شده، با توجه به تعداد پیوند داریم:

$$\text{تعداد پیوند} = \frac{2 * \text{تعداد پیوند} - \text{مجموع الکترون لایه ظرفیت (بار یون به آن اضافه شود)}}{2} = \text{تعداد جفت الکترون غیرپیوندی}$$

مثال: برای گونه‌های $PO_4^{3-}, CO_2, HCN, COCl_2$ تعداد جفت ناپیوندی را مشخص کنید.

ذهن زیبا